

Р355

Том V.

Январь—Февраль.

№ 1—2.

РУССКИЙ  
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ,

издаваемый при Волжской Биологической Станции  
под редакцией А. Л. Бенинга.

Орган Общества Исследователей Воды и ее Жизни.

СОДЕРЖАНИЕ.

Оригинальные статьи.

Стр.

От Редакции . . . . .	1
В. И. Жадин. К биологии моллюсков пересыхающих водоемов . . . . .	2
Е. Ф. Гурьянова и П. В. Ушаков. К экологии и географическому распространению <i>Balanoglossus</i> в русских северных морях . . . . .	11
А. А. Парамонов. Некоторые данные к биологии и охране выхухоли . . . . .	17
Б. В. Скворцов. О новых видах <i>Trachelomonas</i> Ehrbg. из сем. Euglenaceae, описанных из Бельгии и Франции.	24
Б. А. Кузнецов. О составе пищи серой лягушки, <i>Rana temporaria</i> L. . . . .	26

Мелкие известия.

Новые приборы для гидробиологических исследований.—О мечении стерляди на Волге . . . . .	30
--	----

Хроника и личные известия.

Юбилей проф. Н. М. Книповича . . . . .	31
Работы Байкальской Экспедиции Академии Наук . . . . .	32
Исследование реки Оби . . . . .	33
Сводка литературы по изучению фауны пещер . . . . .	34

Гидробиологические рефераты.

Travaux de la Station Biologique de Roscoff. Исследования русских морей вып. 1, Труды Пловучего Морского Научного Института вып. 8 и 10, Дерюгин, Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen Bd. 20, Ström, Revue Algo- logique, Neiman.—А. Л. Бенинга . . . . .	35
Micoletzky, Miezis.—М. М. Левашова . . . . .	37

Bibliographia hydrobiologica rossica 1925 (2).

Перечень 39 работ . . . . .	39
-----------------------------	----

САРАТОВ.

Сарполиграфпром. Типо-лит. № 9. Казарменная, 43.

1926 г.

15—23  $\mu$  lang, mit spiraling verlaufenden Kragen, selten ringförmig verdickt. Geissel 2—3 mal so lang wie der Körper. Verbreitung: Frankreich.

5. *T. intermedia* Dang. var. *elegans* (Conrad).

*T. elegans* Conrad p. 202. Pl. I. Fig. 5. Gehäuse braun fast kugelig 9—10  $\mu$  lang, 8—9,5  $\mu$  breit, fein bestachelt. Geisselloffnung ohne Kragen. Chromatophoren? Geissel 1 $\frac{1}{2}$  mal so lang wie der Körper. Frankreich, in Sümpfen.

6. *T. laevis* sp. nov. var. *ornata* var. nov.

*T. oblonga* Lemm. in Conrad. p. 204. Pl. I. Fig. 13. Gehäuse braun, glatt, oval 13—16  $\mu$  lang, 10—12  $\mu$  breit. Geisselloffnung ringförmig verdickt, seltener mit niedrigem Kragen. Bisher nur aus Frankreich, die typische *T. laevis* sp. nov. ist in der Nord-Mandschurei gefunden.

7. *T. cylindrica* Ehrenb.

*T. euchlora* var. *parvula* Conrad p. 206. Pl. I. Fig. 17.

8. *T. piscatoris* (Fischer) Stokes var. *cribrum* (Conrad).

*T. cribrum* Conrad p. 203. Pl. I. Fig. 10. Gehäuse abgerundet zylindrisch, fein granuliert 30  $\mu$  lang, 20  $\mu$  breit. Vorn halsartig vorgezogen, gerade, glatt. Chromatophoren zahlreich, klein, scheibenförmig. Augenfleck gross. Geissel 2 mal so lang wie der Körper. Bisher nur aus Frankreich.

9. *T. amphora* Swirensko var. *striata* var. nov.

*T. ovoides* Conrad p. 211. Pl. I. Fig. 25. Gehäuse verkehrt eiförmig, braun, dicht mit feinen spiraling verlaufenden Punkten und Strichen besetzt. Länge 18—20  $\mu$ , Breite 12—14  $\mu$ . Bisher nur aus Belgien.

10. *T. reticulata* var. *ornata* var. nov.

*T. reticulata* Klebs in Conrad p. 209. Pl. I. Fig. 23. Gehäuse verkehrteiförmig, hinten allmählich zugespitzt, dicht mit Strichen besetzt. 26  $\mu$  lang, 17  $\mu$  breit, Geisselloffnung mit einem geraden Kragen. Zellen farblos. In faulenden Kulturen in Frankreich und Belgien.

11. *T. foliolata* sp. nov.

*T. amphora* Conrad var. *fusiformis* Conrad p. 203. Pl. I. Fig. 12. Gehäuse glatt, 40  $\mu$  lang, 15  $\mu$  breit. Hinterende verjüngt, zugespitzt. Vorderende verjüngt, mit einem niedrigen geraden Kragen. Bisher nur aus Frankreich.

12. *T. volgensis* Lemm. var. *Kufferathi* (Conrad).

*T. Kufferathi* Conrad p. 209. Pl. I. Fig. 21. Gehäuse im mittleren Teil queroval, 22—25  $\mu$  lang, 40—44  $\mu$  breit, braun bestachelt, mit schräg abgestutzter Mündung. Kragen und Endstachel scharf vom mittleren Teile abgesetzt. Augenfleck klein. Geissel 3—4 mal so lang als der Körper. Bisher nur aus Belgien, im Plankton.

13. *T. Swirenskoi* Skvortzow var. *margaritifera* (Conrad).

*T. margaritifera* Conrad p. 203. Pl. I. Fig. 9. Gehäuse verkehrt eiförmig, braun, granuliert. Kragen gerade zylindrisch 2  $\mu$  lang. Hinterende hat einen geraden Endstachel. Länge 20—38  $\mu$ , Breite 20—25  $\mu$ . Geissel fast 3 mal so lang als der Körper. Verbreitung: Europa (Liège, Limbourg).

Juli, 1925.

Charbin.

.....

## О составе пищи серой лягушки *Rana temporaria* L.

Б. А. Кузнецов (Москва).

Работая в июле и августе 1923 года на Биологической Станции Московского Лесного Института, в Погонно-Лосином острове, под Москвой, под руководством проф. Б. М. Житкова, я занялся изучением питания серой лягушки — *Rana temporaria* L. Для этого я вскрыл 31 экземпляр данного вида, различной величины, и исследовал содержимое желудков. Так как все собранные здесь особи были пойманы в лесу (преимущественно сосново-еловая суборь), то я дополнил моих исследований вскрытием еще 10 экземпляров того же вида, пойманых на ржаных полях, около деревни Щукино, Московского уезда. Животных, найденных мною в желудках исследованных экземпляров,

я определял по возможности до рода и вида и составил подробные списки их. Здесь я приведу только суммарные данные. Найденные формы принадлежат к следующим классам и отрядам.

В желудках лесных особей.	В желудках полевых особей.
Insecta . . . . .	96,5% /
Coleoptera . . . . .	61,6% /
Lepidoptera . . . . .	18,3% /
Hemiptera . . . . .	10,0% /
Diptera . . . . .	1,6% /
Hymenoptera . . . . .	1,5% /
	Orthoptera . . . . . 3,2% /
Myriapoda . . . . .	(Myriapoda отсутствуют).
1) Chilopoda . . . . .	0,8% /
2) Diplopoda . . . . .	1,0% /
Arachnoidea . . . . .	3,5% /
1) Araneina . . . . .	3,5% /
Gastropoda . . . . .	(Gastropoda отсутствуют).
1) Pulmonata . . . . .	9,3% /
Annelides . . . . .	(Annelides отсутствуют).
1) Oligochaeta . . . . .	11,5% /

Так как скорость переваривания лягушкой различных насекомых не одинакова, то и проценты пищи, конечно, не вполне точны.

Просматривая этот список, мы видим, что главной составной частью пищи лягушки являются насекомые, преимущественно жуки (Coleoptera), между тем как другие отряды насекомых и другие классы (многоножки, пауки, моллюски, черви) играют второстепенную роль. Крупная разница имеется между пищей полевых и лесных особей.

У полевых совершенно отсутствуют представители отрядов Рипидопода и Oligochaeta, составляющих 20% пищи лесных особей. Тоже относится к Myriapoda.

Но зато процент Coleoptera и Lepidoptera значительно больше у полевых особей, чем у лесных.

Разница имеется также в составе пищи молоди до двух сантиметров длиною и более взрослых экземпляров. У первых мухи образывают одну из главных составных частей пищи, а у взрослых Diptera почти отсутствуют.

Лягушки, которых я вскрывал, были пойманы в различное время дня, но какойнибудь разницы в составе пищи мне установить не удалось.

Величина проглоченных животных очень различна: в желудке одной и той же лягушки мною были найдены крупный *Scaphibus glabratu* Payk. и небольшой *Julus terrestris* L.

Заглатывая животных, лягушка проглатывает массу посторонних предметов; например, у лягушки в 9 сант. длиною я нашел в желудке 56 игл ели.

Чувство вкуса у лягушки развито, повидимому, очень слабо, т. к. я находил в желудках большое количество насекомых, тело которых обладает неприятным и резким вкусом, напр. *Carabus*, *Pentatomidae*, *Coccinella* и другие.

Мною были поставлены также опыты над быстротой переваривания лягушкой различных насекомых. Для этого я давал лягушке средней величины одну муху и одну жужелицу (*Platista vulgaris* L.) и по прошествии 1, 3, 5, 7 часов вскрывал ее. Вот результаты:

1) В желудке лягушки, накормленной час тому назад, *R. vulgaris* L. была еще жива (!), а муха совершенно не разложившейся.

2) В желудке лягушки, накормленной три часа тому назад, оба насекомых были совершенно целы. Ту же картину мы видим после пятичасового пребывания в желудке.

3) В желудке лягушки, накормленной семь часов тому назад, *Platista vulgaris* L. осталась совершенно целой, а муха распалась на части (голова—грудь—крылья). Как мы видим, переваривание идет очень медленно.

Устанавливая качественный и количественный состав пищи *R. temporaria* L., мы должны поставить себе вопрос—полезна или вредна серая лягушка вообще и для лесного хозяйства в частности.

По сделанному мною подсчету в число проглоченных животных входят около 38% безусловно вредных, около 10% более или менее безразличных и около 37% полезных. Следовательно, полезные и вредные для лесного хозяйства животные представлены почти одинаково. Таким образом при средних нормальных условиях питание *R. temporaria* L. идет в июле и августе таким образом, что она является животным безразличным по отношению к хозяйству человека.

В годы сильного размножения отдельных видов вредных насекомых баланс, можно думать, изменяется в сторону пользы.

В дополнение к этой работе, произведенной в июле и первой половине августа 1923 г., мною была произведена ловля и вскрытие лягушек того же вида (*R. temporaria* L.) во второй половине августа и первой половине сентября 1924 года.

Тут мне пришлось столкнуться с большими трудностями: во первых лягушки в это позднее время года попадались сравнительно редко, во-вторых, очень часто желудки в скрытых мною лягушках были пусты.

Если мы сравним пищу лягушек, пойманых в июле и начале августа, с пищей лягушек, пойманых в конце августа и в начале сентября, то мы не увидим большой разницы. Для наглядности при-  
веду таблицу.

Июль и первая половина августа.	Вторая половина августа и сентябрь.
Coleoptera . . . . .	Coleoptera . . . . .
Lepidoptera . . . . .	40,0%
Hymenoptera . . . . .	15,0%
Diptera . . . . .	9,0%
Arachnoidea . . . . .	3,8%
	3,9%

Таким образом разница заключается в увеличении количества *Lepidoptera* и *Nycteoptrera* за счет *Mollusca* и *Oligochaeta*, которых у лягушек, пойманных в конце лета, со- всем не встречается. Также бросается в глаза отсутствие у последних *Phyllobius glaucus* Scop., очень характерного для июльских особей, и значительное увеличение % жужелиц (*Carabidae*) за счет *Phyllobius*, что значительно увеличивает % полезных животных проглоченных лягушкой. Теперь, следовательно, количество полезных животных, проглоченных лягушкой, довольно значительно превышает количество вредных.

Вот проценты вредных, безразличных и полезных животных, найденных в желудках исследованных особей *Rana temporaria* L. за вторую половину августа и первую половину сентября.

Вредные.	Безразличные.	Полезные.
23%	22%	40,5%

Декабрь, 1924 г.

### Über die Nahrung des Grasfrosches, *Rana temporaria* L.

V o n

B. A. Kusnetzov (Moskau).

Es wurden an der Biologischen Station des Moskauer Forst-Institutes einige Untersuchungen über den Nahrungsbestand der Grasfrösche ange stellt.

Auf der ersten Tabelle finden sich links die Bestandteile in Fröschen aus Tannenwald und rechts aus solchen vom Felde. Einige Versuche über die Verdauungszeit zeigen, dass dieselbe nur langsam vor sich geht.

Die Zahlen am Schluss der Arbeit zeigen die % der schädlichen, keine Rolle spielenden und nützlichen Insekten, welche im Froschmagen gefunden wurden.



Мелкие известия.—Kleinere Mitteilungen.

Новые приборы для гидробиологических исследований.

Neue Apparate für hydrobiologische Zwecke.

Фирма Р. Альтманн (Berlin, Luisenstrasse, 47) в ближайшее время выпускает ряд новых гидробиологических приборов:

1) Прибор для исследования нейстона, состоящий из инструментов для взятия пленок водной поверхности, камеры Кольквица, пинцетов, стекол, капельниц и др.

2) Камера Кольквица, вставленная в металлическую оправу, помощью которой ею возможно брать пробы с глубин до  $1-1\frac{1}{2}$  м. Оба прибора изготовлены по данным В. М. Рылова.

3) Плоские квадратные чашки с делениями в см. на нижней стороне. Чашки эти удобны при разборке материала, собранного дночерпателем для количественных определений.

---

Волжской Биологической Станцией (Саратов) в настоящее время продаются: планктонные сети Цеппелина (20—30 р.), прибор для определения концентраций водородных ионов (с пересылкой 19 р.) и батометр по Руттнеру (55 р.).

---

О мечении стерляди на Волге.

Über Sterletmarkierung an der Wolga.

Рыбоводной организацией Наркомзема Татарской Республики в стерляжью кампанию 1925 г. с целью выяснения миграции стерляди произведено мечение медными номерованными метками: на пункте р. Волги—130 штук рыбы с метками на правой жаберной крышке и на пункте р. Камы—128 штук с метками на спинном плавнике.

О случае поимки рыб с означенными метками, редакция просит ей сообщить, с точным указанием номера и места поимки рыбы.

Б.

THE RUSSIAN  
HYDROBIOLOGICAL JOURNAL.

The Journal appear in 5—6 copies yearly, each of 2—3 printed speccts.

Annual subscription (1926) 4.00 Dollar.

The price of volume I, II, III and this of vol. IV—4.00 Dollar one.  
Persons, wishing to receive the Journal, are requested to apply to  
the editors office.

Adress: Biological Volga—Station, Saratov, USSR.

Dr. phil. A. Behning.

---

Die Russische  
HYDROBIOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

erscheint in 5—6 Heften jährlich, von 2—3 Druckbogen jedes.

Der Preis des Jahrgangs 1926 (incl. Zusendung) beträgt 4 Dollar.

Die früher erschienenen Jahrgänge I—IV kosten pro Band—4.00 Dollar.

Saratow, USSR,  
Biologische Wolga-Station.

Redaktion  
der Russischen Hydrobiologi-  
schen Zeitschrift.

Dr. phil. A. Behning.

1930

715

Band V.

Januar—Februar.

№ 1—2.

## RUSSISCHE

**HYDROBIOLOGISCHE ZEITSCHRIFT.**

Herausgegeben an der Biologischen Wolga—Station unter Redaktion

von

Dr. phil. A. L. Behning.

Organ der Gesellschaft zur Erforschung des Wassers und seines Lebens.

## INHALT.

Seite.

## Originalaufsätze.

Zum neuen Jahrgang . . . . .	1
W. I. Shadin. Zur Biologie der Süßwassermollusken vorübergehender Gewässer . . . . .	2
E. F. Gurjanova und P. W. Uschakoff. Zur Oekologie und geographischen Verbreitung von <i>Balanoglossus</i> in den russischen nordischen Meeren . . . . .	11
A. A. Paramonov. Einige Beiträge zur Biologie und zum Schutz der Bisamspitzmaus im Gouvernement Pensa . .	17
B. W. Skwortzov. Ueber neue Euglenaceen der Gattung <i>Trachelomonas</i> Ehrenberg aus Belgien und Frankreich.	24
B. A. Kusnetzov. Ueber die Nahrung des Grasfroschs, <i>Rana temporaria</i> L. . . . .	26

## Kleinere Mitteilungen.

Neue Apparate für hydrobiologische Zwecke.—Ueber Sterletmarkierung an der Wolga . . . . .	30
---	----

## Chronik und Personalnotizen.

Das Jubiläum von Prof. N. M. Knipowitsch . . . . .	31
Die Arbeiten der Baikalsee-Expedition der Akademie der Wissenschaften im Jahre 1925 . . . . .	32
Untersuchung des Flusses Obj in Sibirien . . . . .	33
Ein Literaturverzeichnis über rezente Höhlenfauna . . . . .	34

## Hydrobiologische Referate.

Travaux de la Station Biologique de Roscoff, Explorations des Mers Russes fasc. 1, Berichte des Wiss. Meeresinstituts Lief. 8 und 10, Derugin, Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen Bd. 20, Ström, Revue Algologique, Neiman.— Von A. L. Behning . . . . .	35
Micoletzky, Miezis.—Von M. M. Lewaschoff. . . . .	37

## Bibliographia hydrobiologica Rossica 1925 (2).

Verzeichnis von 39 Arbeiten . . . . .	39
---------------------------------------	----

Saratow,  
Polygraphische Abteilung.

Druckerei № 9.

1926.

