

аквариум

4/2004 июль – август

ISSN 0869-6691



Золото Востока

(стр. 16)



ISSN 0869-6691



БОЛОТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ

В.ВЛАСЕНКО
с.Трушки, Украина

Не очень большой выбор предлагает наша местная европейская фауна любителям черепах – одних из самых спокойных и флегматичных животных. Наиболее доступным видом является европейская болотная черепаха. В прошлые века, если верить Брему, это животное было широко распространено по всей Европе и в некоторых местах представляло истинную проблему для рыболовных хозяйств. Количество населявших водоемы черепах определялось количеством плавающих на поверхности воды рыбьих «плавательных пузырей», ведь основу рациона этих животных составляют именно рыбы.

Конечно, те времена уже давно прошли. О подобном изобилии живности мы и вспоминать уже не можем, да и наши прадедушки с прабабушками вряд ли были свидетелями этого. Но болотная черепаха и в данное время изобилует в некоторых водоемах Европы. В первую очередь наибольшее количество этих животных обнаруживается в прудах рыбных хозяйств и небольших водоемах заповедных зон. Расширению ареала болотной черепахи немало способст-

вует и принятное в Европейском союзе жесткое охранное законодательство.

Черепахи попадают в аквариумы и террариумы любителей, как правило, двумя путями.

Первый – приобретение маленьких и очень симпатичных черепах-подростков на «Птичке». Здесь уместно вспомнить анекдот о дяде, который пришел на рынок с медведем в поис-



Из родной стихии
в пластиковый тазик –
для карантинирования
и противогрибковой
обработки.



ках продавца, в прошлом году всучившего ему симпатичного хомячка.

Второй – находка неожиданного трофея во время отдыха на природе. в местах естественного обитания животных. Ах, как

трудно бывает равнодушно пройти мимо симпатичной черепашки, такой беззащитной, маленькой и слабенькой, на которую можно наступить и раздавить, и она наверняка не сможет самостоятельно выжить в

этом огромном заболоченном водоеме с такими огромными рыбами и, возможно, даже змеями! Ведь ей будет значительно удобнее и безопаснее в моем домашнем аквариуме!

Как правило, подобные «подарки» приходятся на середину лета,

когда новорожденные симпатичные черепашата, вышедшие из яиц, ищут путь к водоему. В этот самый сложный период своей жизни к многочисленным врагам из дикой природы присоединяется и человек.

ТЕРРАРИУМ




Емкость с песком –
самый простой
и надежный инкубатор.

Просвечивание
черепашьего яйца
облегчает процесс отбраковки.
Этот эмбрион развивается
нормально.

Из-за второй притяжки и в моем хозяйстве за десятилетие собралось немалое стадо бывших беззащитных малышей, которые в данное время такими уже совсем не кажутся. Размер некоторых экземпляров превышает 20 сантиметров. И содержание этого стада – удовольствие совсем не дешевое.

Конечно, как и все черепахи, болотная относится к одним из самых спокойных по характеру представителей герпетофауны. Даже отловленная в дикой природе взрослая особь очень быстро привыкает к человеку. Спустя несколько недель содержания в неволе она совершенно перестает бояться и начинает с радостью принимать пищу из рук хозяина. И, как ни странно, казалось бы, такая опасная ласка, как по-глаживания пальцем по вытянутой из-под панциря голове и шее (самые уязви-



мые места черепахи), доставляет ей истинное наслаждение.

Несмотря на кажущуюся простоту содержания и спокойный характер, перед тем как обзавестись европейской болотной черепахой, я рекомендовал бы вам сначала очень хорошо подумать, стоит ли это делать. Нужно всегда помнить бесконечное высказывание

Окраска болотных черепах несколько отличается оттенками. Наиболее светлые экземпляры в природе встречаются в южных областях Украины.


Маленько-го Принца о тех, кого мы приручаем... Относительно маленькие и симпатичные черепашата уже за несколько лет превращаются в очень прожорливых и требовательных к качеству воды хищников. Из этого следует, что совместное содержание их с декоративными рыбами неприемлемо. Да и сам аквариум с болотными черепахами очень быстро превращается в болото.

Для содержания одной средней черепахи требуется-

ся сосуд вместимостью не менее 100 л. Кроме того, необходимо обеспечить возможность выхода черепахи из воды на сушу для принятия солнечных ванн. Поэтому наиболее оптимальным можно считать содержание болотных черепах в летних садовых прудах или стационарных фонтанах, которые сейчас любят устраивать в холлах домов и контор состоятельные люди.

К температуре и химическому составу воды болотные черепахи совершенно нетребовательны. Если есть выход на сушу, то и опасность органических загрязнений можно пренебречь. В теплое время года при содержании черепах в закрытом помещении нужно обязательно обеспечить «искусственное солнце» над тем местом, где они будут греться. Это может быть лампа «Power-Sun» или комбинация из ультрафиолетовой и нагревательной ламп.

Молодых черепашат можно кормить мотылем, трубочником, искусствен-



ными кормами. Взрослым животным необходимы рыба, нежирное мясо, искусственные гранулы для крупных водяных черепах.

Постарайтесь оборудовать водоем максимально мощным фильтром, лучше всего канистрового типа. Чистка и подмена воды обязательны и должны осуществляться регулярно. Дело в том, что черепахи употребляют довольно много пищи, соответственно и количество испражнений. За несколько недель пара-тройка взрослых черепах может превратить полутонный водоем с плохой фильтрацией в вонючее болото!

В зимний период болотным черепахам требуется спячка. Если они живут в садовом водоеме глубиной больше метра, он и будет самым лучшим местом для зимовки. Содержащихся в закрытом помещении животных лучше всего перенести в подвал с температурой около пяти градусов. Здесь они смогут зимовать в небольшом аквариуме. Периодически проверяйте качество и температуру воды.

Весной, когда наступит первое настоящее солнечное тепло, начинайте постепенно повышать температуру в зимовальном аквариуме. После прогрева воды до 10-12°C переведите питомцев в их постоянное место жительства. Включите «искусственное солнце». Буквально в течение недели можно будет наблюдать процесс спаривания черепах, а через месяц — кладку яиц.

Как правило, самки за-
рывают яйца в песок или

землю, но бывают случаи, когда при неблагоприятных условиях (недостаточная температура почвы, неподходящая влажность) они откладывают их в воду. Это не опасно. Вынутые из воды яйца нужно перенести в инкубатор. Опыт показывает, что яйца, отложенные в воду и вынутые оттуда не позже, чем через сутки, ничем не хуже тех, которые были отложены по всем правилам.

Я инкубирую яйца болотных черепах в 60-литровом аквариуме с песком. Над ним установлена 60-ваттная лампочка накаливания, которая включена только в светлое время суток. Сосуд-инкубатор установлен в аквариумной комнате (более 20 открытых емкостей с рыбами). Это гарантирует необходимую относительную влажность воздуха. Конечно, удобнее инкубировать яйца черепах в специальных инкубаторах, но не каждый и не всегда может себе это позволить. Как правило, при моем методе инкубации выход молодняка составляет 80-85%, что, по моему мнению, очень неплохо.

Через 68 дней обычно начинается выход черепашат из яиц. Молодых животных я переношу в небольшие аквариумы с низким уровнем воды (около 5-7 сантиметров) и многочисленными островками суши. Молодежь не болеет и отлично растет, если ее кормить мотылем, трубочником и филе нежирной рыбы, периодически устраивать «банны» под ультрафиолетовой лампой.

Иногда террариумист не имеет возможности орга-

низовать своим питомцам зимнюю спячку. В этом случае с черепахами ничего плохого не случается. Правда, зимой они несколько снижают свою активность, большую часть времени лежа на дне аквариума и практически не питаюсь. Весной к ним возвращается обычная подвижность, но процесса спаривания не наблюдается.

Из болезней у болотных черепах наиболее часто встречаются грибковые поражения панциря. Это чаще всего бывает у особей, недавно отловленных из природы, которым недостаточно ультрафиолета и тепла в искусственной среде, или у животных с поврежденным панцирем.

Для борьбы с этими заболеваниями в первую очередь нужно обратить внимание на качество воды, обеспечить ее чистоту, несколько увеличить температуру под обогревательной лампой и, по возможности, повысить интенсивность и продолжительность работы ультрафиолетовых излучателей. Очень полезно погреть заболевших животных под естественными солнечными лучами. В воду аквариума желательно добавить какие-либо противогрибковые препараты типа «Мусориг» фирмы «Sera».

Места поражений также желательно обработать специальными фирмени-
ми средствами для антигрибковой обработки панцирей или тем же «Микопуром».

Такие распространенные у тропических водяных и сухопутных черепах болезни, как ринит и конъюнктивит, как правило у европейской болотной черепахи не встречаются.

Бывают случаи, когда из части инкубированных яиц черепашата не проклевываются или они не могут полностью выйти из яйца. В таких ситуациях следует очень аккуратно сделать небольшое отверстие в яйце и проконтролировать состояние зародыша.

Если зародыш находится еще в слизи, то необходимо яйцо оставить в покое (полезно его несколько увлажнить); есть надежда, что малыш через несколько дней выйдет самостоятельно. Если видно, что он уже готов к выходу (полностью сформирован, открывает глаза, практически сухой), то нужно осторожно вскрыть яйцо и извлечь из него животное. Такие черепашата живут и развиваются ничуть не хуже вышедших из яиц естественным путем.

За 10 лет работы с европейской болотной черепахой я никогда не получал в потомстве альбиносов. Очень интересно знать, не повезло ли в этом смысле кому-либо из других разводчиков.

РЕПТИЛИИ, АМФИБИИ, НАСЕКОМЫЕ

Оптом и в розницу. Прямые поставки, низкие цены.
Ищем поставщиков рептилий и птиц из Средней Азии.
Украина, Белая Церковь
Тел.: +380 44 233-20-52 Факс: +380 44 632-80-91
www.xoosalon.com.ua E-mail: zoo@zoo.bel.com.ua