

Комиссія

643 N 3

ДЛЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ФАУНЫ

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1902—1904 г.

Подъ редакціей предсѣдателя Комиссіи

Г. А. Кожевникова.



МОСКВА.

Университетская типографія, Страстной бульваръ.

1905.

КОМНСІЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАУНЫ

Печатано по постановленію Совѣта Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии
и Этнографіи.

1802—1801 т.

22439

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Зоологическаго музея
Московскаго университета

Дополненія къ спискамъ животныхъ Московской губерніи (№ 5).

(Addenda ad Faunam Mosquensem).

(См. „Дневникъ Зоологическаго Отдѣленія“ т. III, № 4).

Результаты изслѣдованія Московской фауны за періодъ времени съ 23 апрѣля 1902 года по 1 декабря 1904 года опубликовываются Комиссіей, по примѣру прежняго, въ двойной формѣ: или въ формѣ „Дополненій“ и „Поправокъ“ къ существующимъ спискамъ, или въ формѣ обработки отдѣльныхъ группъ какъ самостоятельнаго дѣла на основаніи имѣющагося налицо матеріала. Разницу въ формѣ обработки легко увидать безъ дальнѣйшихъ поясненій.

Конечно, при обиліи постоянно накапливающихся новыхъ фактовъ и при отрывочности и неполнотѣ имѣющагося налицо матеріала, мы не можемъ сказать, что какал-либо изъ статей даетъ намъ болѣе или менѣе полное и точное представленіе и о составѣ, и о подробностяхъ географическаго распредѣленія данной группѣ по Московской губерніи, но все-таки каждая изъ такихъ статей является крупнымъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ изученія нашей фауны и надо пожелать, чтобы нашлось побольше работниковъ, которые соглашались бы обрабатывать полностью весь накопившійся къ данному времени въ коллекціяхъ Комиссіи матеріаль по какой-нибудь группѣ.

Въ тѣхъ группахъ, гдѣ возможенъ болѣе или менѣе точный подсчетъ извѣстныхъ формъ, я при печатаніи „Дополненій“ поставилъ очередные номера, продолжающіе номерацию прежнихъ списковъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ такая номерация, вопреки принятому въ предыдущемъ выпускѣ правилу, не введена, а виды переномерованы по порядку, началъ съ № 1. Это сдѣлано для такихъ группъ, гдѣ, какъ можно полагать, въ старыхъ спискахъ приведено порядочно видовъ, которые приходится, или придется вычеркнуть, замѣнивъ ихъ другими. При такихъ условіяхъ подсчетъ очень затруднителенъ и долженъ быть отложенъ до будущаго времени.

Aves.

274. *Cuculus intermedius* Vahl., по сообщенію Э. К. Лоренца, добыта въ маѣ 1903 года въ „Раменскомъ“ казенномъ лѣсничествѣ, въ Дмитровскомъ уездѣ.

Фауна пресмыкающихся и земноводныхъ Московской губерніи, какъ это ни странно, до сихъ поръ не была предметомъ спеціальнаго систематическаго изслѣдованія. Однако, одинъ изъ членовъ Комиссіи, Л. Л. Сабанинъ въ, хорошо знающій эти двѣ группы, имѣеть довольно большой запасъ личныхъ наблюденій надъ нѣкоторыми видами, и я считаю полезнымъ опубликовать его данныя въ замѣну списка *Amphibia* и *Reptilia*, напечатаннаго въ „Primitiae Faunae Mosquensis“ 1902 г. Въмѣстѣ съ этимъ позволяю себѣ высказать надежду, что въ недалекомъ будущемъ Комиссія получитъ возможность опубликовать подробную работу о Московскихъ *Reptilia* и *Amphibia*, въ которой будетъ изучено: 1) поскольку систематическіе признаки нашего матеріала укладываются въ имѣющіяся литературныя данныя, 2) каковъ образъ жизни рептилій и амфибій въ Московской губерніи, 3) каково детальное распредѣленіе этихъ животныхъ по губерніи, частота ихъ нахожденія, обиліе особей и т. п., 4) какъ вліяютъ условія мѣстности на ихъ распредѣленіе.

Между прочимъ, необходимо сознаться, что нашъ запасъ фактическихъ данныхъ о столь обыкновенныхъ животныхъ крайне скуденъ, и потому желателенъ возможно обильный и разнообразный матеріаль по этимъ группамъ изъ многихъ мѣстностей каждаго уѣзда. Матеріаль слѣдуетъ доставлять въ Зоологическій музей Университета. Необходимое условіе: точное и подробное обозначеніе мѣста и времени поимки каждаго экземпляра.

Г. Кожевниковъ.

Reptilia.

1. *Lacerta agilis* L. Встрѣчается преимущественно въ южной половинѣ губерніи. Яйца несетъ въ маѣ. Молодые ящерицы выходятъ въ срединѣ лѣта, въ іюнѣ и іюль.

2. *Lacerta vivipara* Jask. Встрѣчается повсюду (иногда на болотистыхъ лугахъ, на которыхъ предыдущій видъ не попадаетъ). Дѣтенышей рождаетъ въ іюнѣ и іюль.

3. *Anguis fragilis* L. Встрѣчается довольно часто. Экземпляры извѣстны (по даннымъ Комиссiи) изъ Московскаго, Рузскаго, Подольскаго и Серпуховскаго уѣздовъ.

4. *Tropidonotus natrix* L. Обыкновененъ. Любитъ держаться въ заросляхъ около воды.

5. *Coronella austriaca* Laur. Въ складѣ Зоологическаго Музея найденъ одинъ экземпляръ изъ Хорошова, Московскаго уѣзда, съ этикеткой, писанной рукой А. Н. Борчагина. Видъ этотъ новый для списковъ Московской фауны, но находеніе его не представляетъ ничего невѣроятнаго, хотя, конечно, крайне важны подтвержденія находенія у насъ новой змѣи, на что позволяемъ себѣ обратить особое вниманіе гг. членовъ Комиссiи.

6. *Vipera berus* L. Встрѣчается довольно часто, мѣстами въ очень большомъ количествѣ. Попадаются совершенно черныя особи.

7. *Clemmys caspica* Gm. До сихъ поръ извѣстна лишь въ небольшомъ числѣ экземпляровъ изъ Бронницкаго уѣзда (Красково и Удѣльная), Подольскаго уѣзда (между деревнями Десна и Красная Пахра), и Серпуховскаго уѣзда. Подробности относительно этихъ экземпляровъ см. въ замѣткѣ Г. А. Кожевникова на стр. 8 „Дневника Зоол. Отд.“ т. III, № 4.

Замѣчена также въ Свибловѣ, Московскаго уѣзда.

Emys orbicularis, помѣченная въ прежнемъ спискѣ московскихъ рептилій, до сихъ поръ не подтверждена найденными экземплярами. Для рѣшенія вопроса, встрѣчается ли этотъ видъ въ Московской губерніи, а также для выясненія условій жизни и распространенія у насъ каспійской черепахи, желательно, чтобы всѣ экземпляры черепахъ, находимые на волѣ въ предѣлахъ Московской губерніи, доставлялись на просмотръ въ Зоологическій Музей Университета вмѣстѣ съ подробными указаніями условій находенія. Желательно также, чтобы лица, выпускающія привозныхъ черепахъ изъ террариумовъ на волю, ставили на нихъ мѣтки и сообщали объ этомъ въ Комиссiю, какъ это сдѣлалъ покойный Р. Р. Вальхъ.

Печатаемый ниже списокъ *Mollusca* представляет собою не „дополненія“ къ фаунѣ Московской губерніи, а просто обработку всего матеріала по моллюскамъ, который накопился въ Комиссiи къ осени 1903 года. Цѣль опубликованія этого списка возбудить интересъ къ подробному изученію этого типа въ предѣлахъ нашей губерніи. Имѣющійся въ нашемъ распоряженіи матеріалъ еще далеко недостаточенъ для этого, необходимо усиленное коллектированіе для того, чтобы дать впоследствии кому-либо возможность написать подробную систематическую и фаунистическую работу по московскимъ моллюскамъ. Напомню, что французскій зоологъ Кутань*) счелъ возможнымъ говорить объ из-

*) Coutagne, G. Recherches sur le polymorphisme des mollusques de France. Lyon. 1895.

Amphibia.

1. *Molge vulgaris* L. Встрѣчается повсюду. Экземпляры имѣются изъ уѣздовъ Московскаго, Рузскаго, Дмитровскаго, Бронницкаго, Подольскаго и Серпуховскаго. Спариваніе происходитъ въ апрѣлѣ и маѣ.

2. *Molge cristata* Laur. Встрѣчается повсюду. Экземпляры извѣстны изъ тѣхъ же уѣздовъ какъ и для предыдущаго вида. Спариваніе въ апрѣлѣ и маѣ.

3. *Rana esculenta* L. Встрѣчается повсюду. Въ коллекціяхъ Комиссiи имѣются слѣдующія разновидности:

a) *typica* — зеленая съ большимъ метатарзальнымъ бугоркомъ.

b) *lessonae* — большею частью буроватая.

c) *ridibunda* — темная съ свѣтлой полосой на спинѣ и маленькимъ метатарзальнымъ бугоркомъ. Эта разновидность достигаетъ 15 сант. длины, не считая заднихъ ногъ.

Спариваніе происходитъ въ маѣ.

4. *Rana temporaria* Schn. Встрѣчается повсюду. Спариваніе въ апрѣлѣ.

5. *Rana arvalis* Nillss. Встрѣчается повсюду. Спариваніе въ апрѣлѣ и маѣ.

6. *Bombinator igneus* Laur. Встрѣчается мѣстами. Экземпляры имѣются изъ уѣздовъ Московскаго, Рузскаго, Подольскаго и Серпуховскаго.

7. *Pelobates fuscus* Laur. Встрѣчается мѣстами. Имѣются экземпляры изъ Московскаго, Рузскаго, Бронницкаго, Подольскаго и Серпуховскаго уѣздовъ. Спариваніе происходитъ въ апрѣлѣ или началѣ мая.

8. *Bufo vulgaris* Laur. Встрѣчается повсюду. Имѣются черныя экземпляры съ черной радужиной (Свиблово).

9. *Bufo viridis* Laur. Мѣстами очень обыкновенна. Извѣстны экземпляры изъ Московскаго, Рузскаго, Подольскаго и Серпуховскаго уѣздовъ. Встрѣчается преимущественно въ каменистыхъ мѣстностяхъ. Спариваніе происходитъ въ апрѣлѣ и маѣ.

Bufo calamita Laur., повидимому, въ Московской губерніи не встрѣчается.

Л. Л. Сабитъевъ.

мѣнчивости французскихъ моллюсковъ, только собравши около тридцати тысячъ экземпляровъ ихъ съ нѣсколькихъ сотъ станцій. И онъ былъ вполне правъ, дождавшись такого обилія матеріала: только благодаря этому его выводы убѣдительны.

Несмотря, однако, на всю неполноту и отрывочность матеріала, несмотря на то, что моллюскамъ Московской губерніи посвящены четыре специальныхъ работы, Рагинскаго, Надежина, Милашевича и Зыкова) публикуемый списокъ все-таки значительно расширяетъ наши свѣдѣнія о московскихъ моллюскахъ, что еще разъ показываетъ, насколько легко достигнуть интересныхъ результатовъ, работая надъ Московской фауной.

Г. Кожевниковъ.