



ВЕСТНИК

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии

Научно-теоретический журнал
№2(9) сентябрь-ноябрь 2009

Главный редактор
д.с.-х.н., профессор А.В.Дозоров

Зам.главного редактора
д.б.н., профессор В.А.Исайчев
к.э.н., доцент М.В.Постнова

Редакционный совет
д.с.-х.н., профессор А.Х.Куликова
к.э.н., профессор Л.И.Иванова
д.б.н., профессор Е.М.Романова
д.в.н., профессор В.А.Ермолов
д.с.-х.н., профессор В.Е.Улитко
д.т.н., профессор В.И.Курдюмов

Редактор
И.С.Королева
Дизайн и компьютерная верстка
Д.Н.Хлынов

Подписано в печать 20.11.09
Формат 70 x 108/8
Печ.л. 10 Усл.п.л. 14
Тираж 100 экз.
Заказ

Адрес издателя:
432980, г. Ульяновск,
Бульвар Новый Венец, 1.

© ФГОУ ВПО «УГСХА», 2009

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Экономика, финансы, бухгалтерский учёт.

Бобылев А.С.

Влияние экономического кризиса на состояние
финансово-кредитной системы России..... 3

Катаев В.И., Сасина А.В.

Сельское хозяйство – катализатор роста доходов
территориальных бюджетов..... 11

Ермошкина Т.А.

Внутренние и внешние факторы, определяющие фи-
нансовую устойчивость предприятий аграрного се-
ктора экономики..... 15

Соколов А.П., Богданова Н.А., Рассадин В.В.,

Рассадин А.В.

Совершенствование функций учета расчетов с по-
ставщиками и заказчиками..... 21

Саевдокасова К.Ж.

Организация банковского регулирования и надзора
в Республике Казахстан..... 25

Попова Л.А.

Учет обесценения активов..... 30

Мухарицын О.В.

Методология формирования отчета о прибылях
и убытках..... 35

Ильина Т.Ф.

Выбор метода начисления амортизации по основным
средствам и нематериальным активам и организация
их учета на примере ТОО «Элит»..... 40

Попова Л.А.

Учет расходов по вознаграждению..... 43

Иванова Л.И., Шакурова Л.Н.

Расчет порога рентабельности по данным бухгалтер-
ской отчетности..... 46

Бобылев А.С., Морозова Е.А

Аналитический подход к оценке и восстановлению
платежеспособности предприятия..... 50

Агрономия. Землеустройство.

Куликова А.Х., Дронина О.С.

Эффективность предпосевной обработки семян са-
харной свёклы биопрепаратами и диатомитовым по-
рошком в условиях среднего Поволжья 55

ском – $43,62 \pm 12,92\%$, Новоспасском – $45,45 \pm 2,42\%$, Павловском – $44,00 \pm 2,77\%$ районах экстенсивность инвазии соответствовала выше среднему уровню. Остальные районы характеризовались более низкими показателями, не превышающими 26%, что соответствует среднему и низкому уровням инвазии (рис.1б).

Высокий уровень *O.dentatum* был отмечен в Сенгилеевском – $65,66 \pm 2,54\%$, Теренгульском – $64,46 \pm 2,23\%$, Ульяновском – $64,91 \pm 7,22\%$, Цильнинском – $60,30 \pm 2,88\%$, Чердаклинском – $63,11 \pm 1,38\%$ районах. Экстенсивность инвазии выше среднего уровня регистрировалась в хозяйствах Базарно-Сызганского – $30,53 \pm 2,46\%$, Барышского – $25,95 \pm 1,21\%$, Инзенского – $29,36 \pm 2,87\%$, Мелекесского – $30,08 \pm 0,69\%$, Новоспасского – $44,46 \pm 1,43\%$, Павловского – $42,40 \pm 0,56\%$ районов. В остальных районах показатели не превышали 10% (рис.1в).

Различия по уровню инвазированности кишечными нематодозами в разных административных районах связано, прежде всего, с условиями содержания и санитарно-гигиеническими мероприятиями по профилактике инвазий.

Выводы.

1. Гельминтофаунистический комплекс *Sus scrofa domestica* на территории региона представлен 14 видами: *Opistorchis felineus*, *Cysticercus cellulosae* (*Taenia solium*), *Cysticercus tenuicolis* (*Taenia hydatigena*), *Echinococcus granulosus*, *Macracanthorhynchus hirudinaceus*, *Strongyloides ransomi*, *Ascaris suum*, *Trichocephalus suis*, *Oesophagostomum dentatum*, *Phyocephalus sexalatus*, *Metastrongylus elongates*, *Hyostrongylus rubidus*, *Trichinella spiralis*, *Ollulanus suis*;

2. Наиболее распространенными видами являются *Ascaris suum* при ЭИ $30,50 \pm 2,00\%$, *Oesophagostomum dentatum* при ЭИ $28,56 \pm 1,56\%$ и *Strongyloides ransomi* при ЭИ $28,47 \pm 1,24\%$;

3. Стабильные нематодозные очаги сочетанных инвазий (*A.suum* + *O.dentatum* + *S.ransomi*) наиболее часто отмечались в хозяйствах Теренгульского, Ульяновского и Чердаклинского районов.

4. Нестабильные очаги инвазии были зарегистрированы на территории Сенгилеевского, Мелекесского, Цильнинского, Новоспасского, Павловского и Базарно-Сызганского районов.

Литература:

1. Беэр С.А. Паразитизм и вопросы биоразнообразия / Теоретические и прикладные проблемы паразитологии (Труды Ин-та паразитологии РАН. Т.43). – М.: Наука. – 2002. – С.25-36
2. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды: Справочник. – М.: Колос, 1983. – 208 с.
3. Романова Е.М., Индирикова Т.А., Камалетдинова Г.М., Романов В.В., Индирикова О.А., Губайдуллина З.М. Региональный экологический мониторинг биобезопасности среды в зоне среднего Поволжья. – Ульяновск, УГСХА, 2006. – 159 с.

УДК 502+576.89

ПАРАЗИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ БИОЦЕНОЗА

Е.М.Романова, Т.А.Индирикова, Е.А.Матвеева
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Паразитарные системы являются информативными моделями для изучения процессов, протекающих в биоценозах, регулируемых антропогенными факторами. Любые изменения в популяции хозяев приводят к изменениям в популяциях паразитов. От ха-

рактера и силы воздействия внешних факторов зависит степень разбалансированности эволюционно сложившихся систем «паразит-хозяин» [1,4,6].

Целью нашей работы явилась сравнительная оценка эндопаразитофауны озерной лягушки (*Rana ridibunda*, Pallas, 1971) по те-

чению р. Свияга в зависимости от уровня антропопрессии.

В соответствии с целью **задачами** исследования были:

1. Оценка стабильности развития озерной лягушки в разных биотопах р. Свияга в зависимости от уровня антропопрессии.

2. Сравнительный анализ гельмитофауны озерной лягушки в различных биотопах.

3. Экологическая оценка видового разнообразия гельмитофауны.

Материал и методы исследования

Исследования проводились в 2007-2009 гг. Были исследованы 3 популяции озерной лягушки по течению р. Свияга: № 1 – на входе реки в город ($n_1 = 27$), № 2 – на территории города ($n_2 = 93$), № 3 – на выходе реки из города ($n_3 = 28$). Всего было исследовано 148 особей *R. ridibunda* ($n_{\text{♀}} = 66$, $n_{\text{♂}} = 82$). Для установления наличия паразитов проводилось полное гельминтологическое вскрытие по К.И. Скрябину (1928) [10], видовая принадлежность гельмитов определялась по Рыжикову, Шарпило (1980) [9]. Разнообразие гельмитов оценивалось с использованием индексов видового разнообразия [8]. Оценка стабильности развития проводилась по стандартной методике [5]. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета MS Excel 2003.

Результаты исследований

По результатам проведенного полного гельминтологического вскрытия установлено, что экстенсивность инвазии (ЭИ) особей *R. ridibunda* в биотопах №1 и №3 была одинаковой (в №1 – 51,85%; в №3 – 50%) и достоверно выше, чем в биотопе №2 – 41,94 %.

Зараженность лягушек в черте города (биотоп №2) ниже, чем в пригородных биотопах, что связано с менее благоприятными условиями для реализации жизненного цикла паразитов, особенно гетероксенных, на урбанизированной территории, в частности, меньшей плотности окончательного хозяина и отсутствием подходящих промежуточных хозяев – разных видов моллюсков [2,3].

Оценка стабильности развития особей озерной лягушки показала, что состояние особей в биотопах №1 (уровень ФА=0,42±0,02) и №3 (ФА=0,49±0,02) соответствует 1 баллу по шкале стабильности развития земноводных и характеризуется как условно нормальное, в

биотопе №2 уровень ФА составил $0,51 \pm 0,02$, соответствует 2 баллам и показывает, что имеются начальные незначительные изменения от нормального развития.

Анализ гельмитофауны озерной лягушки в р. Свияга показал: в биотопе №1 было обнаружено 9 видов гельмитов – *Halipegus ovo-caudatus* Vulpian, 1859, *Diplodiscus subclavatus* (Pall., 1760), *Gorgodera pagenstecheri* Ssinitzin, 1905, *Opisthioglyphe ranae* (Froelich, 1791), *Pneumonoeces asper* (Looss, 1899), *Pn. variegatus* (Rud., 1819), *Prosotocus confusus* (Looss, 1894), *Rhabdias bufonis* (Schrank, 1788), *Spirocercula lupi* (Rud, 1819), larvae.




Рис. 1 Видовое разнообразие гельмитофауны озерной лягушки в биотопе №1 р. Свияга

В биотопе №2 – 13 видов – *Encyclometra colubrimurorum* (Rud., 1819), larvae, *Skrjabinioeces* sp. Shevchenko, 1965, *Skr. similis* (Looss, 1899), *Skr. breviansa* Sudarikov, 1950, *Pn. variegatus* (Rud., 1819), *Pn. asper* (Looss, 1899), *Strongyloides* sp., *Pleurogenes intermedius* Isaitschikow, 1926, *Op. ranae* (Froelich, 1791), *Spirometra erinaceieuropaei* (Rud., 1819), larvae, *Rh. bufonis* (Schrank, 1788), *Pleurogenoides medians* Olson, 1876, *Ascarops strongylina* (Rud, 1819), larvae.




Рис. 2 Видовое разнообразие гельмитофауны в биотопе №2 р. Свияга

В биотопе №3 – 8 видов – *Astiotrema monticelli* Stossich, 1904, larvae, *Op. ranae* (Froelich, 1791), *Oswaldocruzia filiformis* (Goeze, 1782), *Pn. asper* (Looss, 1899), *Pn. variegatus* (Rud., 1819), *Rh. bufonis* (Schrantz, 1788), *D. subclavatus* (Pall., 1760), *Pr. confusus* (Looss, 1894).




Рис. 3 Видовое разнообразие гельминтофагии в биотопе №3 р. Свияга

По результатам проведенной экологической оценки видового разнообразия гельминтофагии установлено, что наибольшее видовое разнообразие ($H' = 2,20$, при $E = 0,86$) характерно для биотопа № 2, тогда как в пригородных биотопах № 1 и № 3 разнообразие

составило $H'_1 = 1,97$, при $E_1 = 0,89$ и $H'_3 = 1,89$, при $E_3 = 0,91$ [7].

В биотопе №1 доминировали виды *Rh. bufonis* (ЭИ=35,71%) и *Pn. variegatus* (ЭИ=21,43%). В биотопе №2 доминировал вид *Pn. variegatus* (ЭИ=23,08%) и *Skr. breviana* (ЭИ=20,51%). В биотопе №3 - *Pn. asper* (ЭИ=28,57%) и *Rh. bufonis* (ЭИ=21,43%). Индекс Жаккара при сравнении трех биотопов составил 0,55, что говорит о высоком уровне сходства сообществ гельминтов в р. Свияга. При этом индекс Жаккара для биотопов №1 и №2 составил 0,22 (4 общих вида), №2 и №3 – 0,24 (4 общих вида) а №1 и №3 – 0,55 (6 общих видов).

Таким образом, в результате проведенной сравнительной оценки гельминтофагии озерной лягушки в разных биотопах р. Свияга установлено, что наибольшим уровнем ЭИ характеризовался биотоп №2, располагающийся в черте г. Ульяновска, который подвергался наибольшему уровню антропогенного воздействия, в этом же биотопе отмечался наиболее разнообразный качественный и количественный видовой состав гельминтофагии.

Литература:

- Беэр, С.А. Влияние изменений климата на паразитарные системы (стартовые позиции концепции) / Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. - Вып.6. Мат. докл. научн. конф. Москва, 25-27 мая 2005. - 2005. – С.54-56.
- Буракова, А.В. Особенности заражения гельминтами остромордой лягушки фоновых и урбанизированных территорий / А.В. Буракова // Вестник ОГУ. - 2008. - № 81. – С. 111-116.
- Гинецинская, Т.А. Изменение гельминтофагии *Rana temporaria* в Петергофском парке за 50 лет / Т.А. Гинецинская, Е. Б. Голубева // Эволюция паразитов. – 1990. – С. 211-215.
- Жердева, С.В. Земноводные как экологический объект мониторинга и биоиндикации / С.В. Жердева, Н.И. Сухорукова // Экология ЦЧО РФ. – Липецк, 1999. – № 2. – С. 14–18.
- Захаров, В. М., Чубинишвили, А. Т., Дмитриев, С. Г. и др. Здоровье среды: практика оценки. — М.: Центр экологической политики России, 2000. - 320 с.
- Малышева, Н.С., Романенко, Н.А. Экологопаразитологический мониторинг – М., 2006. – 382 с.
- Матвеева, Е.А. Биологическое разнообразие гельминтофагии *Rana ridibunda* в урбанизированной экосистеме / Е.А. Матвеева, Т.А. Индириякова // Материалы международного экологического форума «Экология большого города». - Современные научноемкие технологии. - № 33. – Москва, 2009. – С. 67-69.
- Мэггаран, Э. Экологическое разнообразие и его измерение: Пер. с англ. – М.: Мир, 1992. – 184 с.
- Рыжиков, К.М., Шарпило, В.П., Шевченко, Н.Н. Гельминты амфибий фауны СССР. – М.: Наука, 1980. – 279 с.
- Скрябин, К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. – М., 1928. – 45 с.